

Verhalten bei Einnahme von Antibiotika

Je nachdem, welches Präparat Ihnen verschrieben wird, nehmen Sie das Medikament folgendermaßen ein:

<input type="checkbox"/> Amoxicillin	<input type="checkbox"/> Clindamycin
1-1-1 je eine Tablette morgens, mittags und abends	1-0-1 je eine Tablette morgens und abends

- **Eine Stunde vor und nach der Einnahme** sollten Sie **keine Milchprodukte** (Milch, Käse, Joghurt, Quark, Rahm, Sahne, Butter) oder andere sehr kalziumreiche Produkte (Blattspinat, Broccoli, manche Mineralwasser) verzehren, da Kalzium Antibiotika bindet und so deren Wirkung beeinträchtigt.
- Lassen Sie dem Medikament Zeit! Erst **nach frühestens 2-3 Tagen** werden Sie eine deutliche Verbesserung bemerken.
- Nehmen Sie die **ganze Packung bis zur letzten Tablette** ein, um Rückfälle und Resistenzbildungen zu vermeiden.
- Sollten Sie jedoch **allergisch** auf das Antibiotikum reagieren (Schleimhaut-Schwellungen, Ausschlag, Juckreiz, Atemnot), nehmen Sie das Antibiotikum **nicht** weiter ein und rufen Sie uns oder Ihren Hausarzt an.
- Auch bei Auftreten von **schmerzhaften Zahnfleisch-Rötungen und / oder weißlichen Belägen** setzen Sie bitte das Medikament ab und melden sich umgehend bei uns.
- **Bauchschmerzen und Durchfall** sind häufige Nebenwirkungen, die aber ein **Beenden der Behandlung nicht rechtfertigen**. Eine zusätzliche Einnahme von zB. Eubiol® kann die Symptome lindern. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Apotheker.